

---

---

# Trồng tỏi

Tỏi là một trong những loại cây trồng dễ dàng và hài lòng nhất đối với những người làm vườn rau tại nhà. Nó mang lại hai loại cây trồng hữu ích; chính những củ tỏi, và những “vây” xanh ngon trước đó một tháng. Bởi vì nó thường được trồng vào mùa thu và bắt đầu phát triển vào đầu mùa xuân, tỏi cung cấp cho khu vườn một thứ gì đó xanh tươi và đáng khích lệ, rất lâu trước khi các loại cây trồng khác nảy mầm.

## Về cây tỏi

Tỏi (*Allium sativa*) là một loài thực vật thuộc họ hành. Các giống tỏi được phân loại thành các giống tỏi mềm (softneck) và tỏi cứng (hay còn gọi là tỏi có ngọn). Các giống tỏi ứng tạo ra một cuống hoa giả được gọi là ngồng tỏi, và thường tạo ra ít tép hoa lớn hơn so với các giống cây tỏi mềm..

Theo nguyên tắc chung, các giống tỏi cứng cứng hơn và có khả năng chống chọi với mùa đông lạnh giá tốt hơn so với các giống tỏi mềm. Cần có các loại dây mềm nếu bện tỏi.



Tỏi mới thu hoạch

## Nguyên liệu ban đầu

Tỏi không tạo ra hoa hoặc hạt. Các tép tỏi được tách ra và trồng. Tỏi mua ở siêu thị thường là tỏi mềm. Những giống cây trồng này không nhất thiết phải thích nghi tốt với khí hậu. Bạn có thể mua giống từ nông dân địa phương hoặc từ các nhà cung cấp hạt giống sẽ vận chuyển tỏi giống. Chỉ gieo hạt sạch; bất kỳ tép nào có dấu hiệu bị mốc hoặc hư hỏng khác nên bị loại bỏ. Nếu bạn đang tiết kiệm nguồn giống tỏi của riêng mình, hãy dành những đầu lớn nhất, có hình dạng đẹp nhất để làm hạt giống và ăn những đầu nhỏ hơn..

Các giống không được tiêu chuẩn hóa, và chúng phát triển theo sự chọn lọc, vì vậy cùng một giống được mua từ các nguồn khác nhau có thể có hiệu suất khác nhau. Tỏi giống được sản xuất tại địa phương thường là một cách tốt để bắt đầu, vì bạn có thể yên tâm rằng các giống sẽ phát triển tốt trong điều kiện khí hậu chỗ bạn trồng.

## Chuẩn bị đất

Tỏi cần đất màu mỡ và phát triển tốt nhất ở đất thoát nước tốt, có nhiều chất hữu cơ. Độ pH của một vườn rau điển hình, 6,0-7,0, là lý tưởng cho tỏi. Theo kiểm tra đất đề xuất dựa trên trang web. Nếu bạn không có kết quả kiểm tra đất, hãy bón 1 kg phân bón 10% nitơ (chẳng hạn như 10-10-10) trên 9 m<sup>2</sup> trước khi trồng. Vào đầu mùa xuân, khi tỏi đã bắt đầu phát triển, tỏi sẽ được hưởng lợi từ việc bón phân bổ sung bằng thức ăn lỏng.

## Trồng

Tỏi phát triển tốt ở nhiệt độ mát mẻ. Ở miền Bắc, tỏi được trồng thành công nhất vào mùa thu. Thời gian trồng lý tưởng từ tháng 10 (đối với các địa phương phía Bắc) đến tháng 11 (đối với các địa phương miền Nam). Đối với củ hoa trồng vào mùa thu, tốt nhất nên để đủ thời gian để củ bắt đầu mọc rễ nhưng không đủ dài để các chồi bắt đầu phát triển trước mùa đông. Nếu chồi bắt đầu phát triển vào mùa thu, đừng lo lắng. Trong hầu hết các trường hợp, tỏi sẽ tồn tại qua mùa đông và nổi lên không bị tổn thương vào mùa xuân.



Cây tỏi trồi lên qua lớp phủ rơm vào đầu mùa xuân.

Nên trồng từng tép, hướng lên trên, sâu từ 2 đến 3 cm. Cây tỏi có thể được trồng thành hàng hoặc theo luống gồm nhiều hàng, nhưng phải có ít nhất khoảng cách 6cm giữa các hàng ở tất cả các phía. Hãy nhớ rằng mỗi tép sẽ trở thành toàn bộ phần đầu của tỏi! Khi mặt đất đã đóng băng, hãy phủ thêm lớp phủ để ngăn sương giá bốc lên và kiểm soát cỏ dại vào mùa xuân năm sau. Một lớp cỏ xén, lá hoặc rơm dày 4 cm sẽ hoạt động tốt. Vào mùa xuân, hãy đảm bảo rằng cây có thể trồi lên qua lớp phủ. Nếu bạn có thể thấy rằng một số không vượt qua được, bạn có thể chọc xung quanh và nói lỏng lớp phủ để giúp chúng.

Bạn đã bỏ lỡ trồng tỏi vào mùa thu? Mặc dù không đáng tin cậy như trồng vào mùa thu, nhưng nếu thời tiết thuận lợi, cây tỏi được trồng vào đầu mùa xuân (tháng 3 đến tháng 4) có thể phát triển thành các đầu trưởng thành để thu hoạch vào giữa mùa hè. Nếu bạn có những nhánh tỏi mọc lên mà bạn đã ủ quá lâu, hãy tiếp tục và trồng chúng - bạn chỉ mất rất ít!

### Thu hoạch và lưu trữ

Thông thường tháng 6, các cây tỏi cứng sẽ cho ra một cuống hoa giả, hay còn gọi là “ngồng tỏi”. Phần cuống này thẳng khi nhú lên, sau đó cuộn tròn lại tạo thành hình xoáy hấp dẫn, và cuối cùng nó lại thẳng. Ở phía trên cùng của ngồng, nơi bạn mong đợi sẽ nhìn thấy một bông hoa, thay vào đó, tỏi sẽ tạo thành nhiều củ nhỏ gọi là "củ".

Hầu hết người trồng loại bỏ vảy khi chúng cuộn tròn. Đó là vì hai lý do. Đầu tiên, loại bỏ lớp vảy sẽ cho phép hình thành đầu tỏi lớn hơn, vì cây sẽ có nhiều năng lượng hơn để chuyển đến đầu. Thứ hai, bản thân các phần bị bỏ là một món ngon. Chúng có vị tỏi nhẹ khi nấu chín và vị tỏi đậm khi ăn sống. Chúng có thể được sử dụng giống như tỏi, nhưng cũng có thể làm món xào tuyệt vời và món pesto tỏi. Ngồng mềm nhất nếu được thu hoạch trước khi chúng thẳng..




Xử lý tỏi trong giá làm bằng dây lưới và gỗ xẻ 2x4.

Củ tỏi đã sẵn sàng để thu hoạch khi một phần ba phía dưới của các lá trên cây đã chuyển sang màu vàng, thường là vào khoảng cuối tháng 6 đến giữa tháng 7. Nhẹ nhàng bới củ bằng cách dùng nĩa hoặc thuổng bên dưới chúng và nhẹ nhàng phôi sạch đất thừa. Hãy cẩn thận không đập tỏi xung quanh khi thu hoạch hoặc xử lý. Bất kỳ vết thương hoặc vết bầm nào đều có thể khiến đầu tỏi bị hỏng trong quá trình bảo quản.


Đặt tỏi, còn nguyên ngọn, ở nơi khô ráo có thông gió tốt (gác xép, nhà để xe và chuồng trại hoạt động tốt) để phơi khô trong vài tuần. Sau khi tỏi khô, cắt phần ngọn dài khoảng 1 cm, tỉa bớt rễ và chà xát nhẹ nhàng để làm sạch chúng. Tỏi nên được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tùy thuộc vào giống và điều kiện bảo quản, tỏi sẽ giữ được từ 6 đến 7 tháng.

### Sâu bọ và các vấn đề bệnh


Ví rút, tuyến trùng và nấm là những loài gây hại phổ biến nhất gây hại cho tỏi. Tất cả đều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng và chất lượng của tỏi. Đối với tất cả những điều này, phòng ngừa là chiến lược tốt nhất để giảm thiểu những vấn đề này. Bắt đầu với giống sạch, tránh trồng tỏi ở những nơi ẩm ướt hoặc trên cùng một vị trí của đất từ năm này sang năm khác, và nhẹ nhàng trong quá trình thu hoạch và chăm sóc.



Củ tỏi



Củ tỏi, bẻ đôi lấy tếp để trồng



Cây tỏi vào thời điểm thu hoạch lý tưởng